



PRE CAG	<p>Pre-op order for</p> <p><input type="radio"/> CAG <input type="radio"/> PCI <input type="radio"/> RHC <input type="radio"/> _____</p> <p style="text-align: right;">Date ____/____/____</p>									
Date __/__/__	<p><input type="radio"/> Admit ward cardio <input type="radio"/> สงฆ์ 2 <input type="radio"/> อญ.1 <input type="radio"/> พิเศษ _____</p> <p><input type="radio"/> CBC, PT, PTT, INR, anti-HIV, BUN, Cr, E'lyte</p> <p><input type="radio"/> CXR, EKG 12 leads</p> <p><input type="radio"/> BW = _____ kg, HT = _____ cm</p> <p><input type="radio"/> ตรวจสอบและยีนสิทธิบัตร</p> <p><input type="radio"/> Clean & shave both groins</p> <p><input type="radio"/> NSS 500 ml IV 40 ml/hr at Lt. arm</p> <p><input type="radio"/> Prepare these equipments to Cath Lab</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1) Electrode x8</td> <td style="width: 33%;">4) NSS 500 ml x1</td> <td style="width: 33%;">7) Syringe 10 ml x5</td> </tr> <tr> <td>2) Needle No.18 x5</td> <td>5) NSS 1000 ml x2</td> <td>8) Heparin x1 vial</td> </tr> <tr> <td>3) Needle No.23 x1</td> <td>6) IV set x2</td> <td></td> </tr> </table> <p><input type="radio"/> Send patient to Cath Lab (on call) with chart & HN stickers x 20</p>	1) Electrode x8	4) NSS 500 ml x1	7) Syringe 10 ml x5	2) Needle No.18 x5	5) NSS 1000 ml x2	8) Heparin x1 vial	3) Needle No.23 x1	6) IV set x2	
1) Electrode x8	4) NSS 500 ml x1	7) Syringe 10 ml x5								
2) Needle No.18 x5	5) NSS 1000 ml x2	8) Heparin x1 vial								
3) Needle No.23 x1	6) IV set x2									
Medication managements										
Order for one day	Order for continuation									
<input type="radio"/> NPO เว้นยา pc เข้า <input type="radio"/> Hold ยา DM และ warfarin/NOAC เข้าวัน intervention	<input type="radio"/> ทานยาเดิมอื่นต่อ <p style="text-align: center;">O ON warfarin/NOAC protocol (case อ.ศศิริมล)</p> <input type="radio"/> If INR >3; hold warfarin/NOAC then correct with <input type="radio"/> Vit K 1 mg PO x1 dose หรือ <input type="radio"/> FFP 1 U IV drip <input type="radio"/> Repeat INR เข้าวัน intervention, if INR>3 consult พ.ศศิริมล									
	<p style="text-align: center;">O OFF warfarin/NOAC protocol (case พ.โอบินธุ์)</p> <input type="radio"/> Off warfarin 3 days before intervention (____/____/____ - ____/____/____) <input type="radio"/> NO enoxaparin bridging <input type="radio"/> With enoxaparin bridging in high-risk group Enoxaparin _____ ml (1 mg/kg) SC q _____ hr (ยาเดิม Pt.) before intervention (____/____/____ - ____/____/____) x2 days <input type="radio"/> Off NOAC _____ for 1 day before intervention (____/____/____) <input type="radio"/> If INR >=1.8 ให้ FFP 1 U <input type="radio"/> If INR >=3 ให้ FFP 2 U <input type="radio"/> Repeat INR หลัง FFP ครบ, if INR >1.8 consult พ.โอบินธุ์									
	O History of contrast allergy									
	<input type="radio"/> Prednisolone (5) 10 tabs at 23.00, 06.00, 12.00 (13, 7, 1 hr before intervention) <input type="radio"/> Benadryl (25) 2 caps at 12.00 (1 hr before intervention) <input type="radio"/> Famotidine (20) 1 tab at 12.00 (1 hr before intervention) <input type="radio"/> Notify Cath Lab ในเวลาราชการเพื่อ set intervention time at 13.00									
_____ (doctor sign) Ver 2 031164										