Cardiac Catherization Laboratory
Chiangrai Prachanukroh Hospital

M5.2.

POST CAG	**Post-op order for**	**O CAG** **O PCI** **O RHC** **O _____**	**Access site _____**

Date __/__/__	
	O NPO 30 min, ถ้าไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้กินได้ O Record V/S & คลำ pulse ทุก 30 นาที x2 then ทุก 1 ชั่วโมงจน clinical stable O Observe bleeding & hematoma at access site, ถ้ามีให้รายงานแพทย์ทันที O ถ้า BP drop ให้รายงานแพทย์ทันที O ถ้าทำ PCI, ให้ทำ EKG at ward หลัง PCI และวันพรุ่งนี้เช้า O Off sheath at _____
	O Femoral access / Brachial access
	O นอนหนุนหมอนได้ 1 ใบ O หมอนทรายทับแผล 1 ชั่วโมง ครบเวลา _____ น. O ห้ามงอเข่า/ขาหนีบ หรือข้อศอกข้างที่ทำ 2 ชั่วโมง ครบเวลา _____ น. O เริ่มเดินได้ หรือขยับข้อศอกได้เมื่อครบ 3 ชั่วโมง ครบเวลา _____ น. O ถ้าคลำ dorsalis pedis pulse ได้เบาลงหรือคลำไม่ได้, notify Cath Lab staff
	O Radial access
	O TR band pressure _____ ml O ห้ามงอข้อมือข้างที่ทำ 24 ชั่วโมง ครบวันที่ _____ เวลา _____ น. O เริ่ม release pressure TR band ครั้งละ 2 ml ทุก 5 นาที ตั้งแต่เวลา _____ น. O ถ้าเริ่มคลายแล้วมี bleeding ให้ใส่ลม 2 ml และเลื่อนการคลายครั้งถัดไปอีก 30 นาที O ถ้าคลำ radial pulse ได้เบาลงหรือคลำไม่ได้, notify Cath Lab staff

Post-intervention medications

Order for one day	**Order for continuation**
O Ticagrelor (Brilinta®) (90) PO 2 tabs stat O Prasugrel (Effient®) (10) PO 6 tabs stat O Clopidogrel (Platogrix®)(75) PO 4 tabs stat O ASA (300) PO 1 tab stat	O ทานยาเดิมอื่นต่อ O Off enoxaparin, heparin or fondaparinux O Off ASA, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor เดิม O ASA (81) 1x1 pc O Ticagrelor (Brilinta®) (90) 1x2 pc O Prasugrel (Effient®) (10) 1x1 pc O Prasugrel (Effient®) (5) 1x1 pc O Clopidogrel (Platogrix®) (75) 1x1 pc O Warfarin (__) _____ เริ่มหลัง off sheath/TR band 2 ชั่วโมง O NOAC _____ (__) _____ เริ่มหลัง off sheath/TR band 2 ชั่วโมง + แนบ DUE เมื่อสั่งใช้ครั้งแรก O Paracetamol (500) 1-2 tab PO prn for pain q 4 hr _____ (doctor sign) Ver 2 031164

HN sticker