



โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การดึง Head halter traction

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 1/กันยายน/2541

รหัสเอกสาร ORT - 004

ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1/มีนาคม/2563

ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโพิติกส์

ผู้จัดทำ นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ

ผู้รับรอง นางปริศนา ะสี

ผู้อนุมัติ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต

ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง การดึง Head Halter Traction

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรอง

(นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ)

(นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต)

(นางปริศนา ะสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ออโรโพิติกส์ ๒

การพยาบาลผู้ป่วยออโรโพิติกส์

ฝ่ายการพยาบาล



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การดึง Head halter traction	วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 1/กันยายน/2541
รหัสเอกสาร ORT - 004	ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1/มีนาคม/2563
ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	
ผู้จัดทำ นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต	ผู้รับรอง นางปริศนา ะสี ผู้อนุมัติ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรดึง Head halter traction ในรูปแบบเดียวกัน และถูกวิธี
2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลในหอผู้ป่วย

นิยามศัพท์

เป็นการเข้า traction โดยใช้ Head halter traction ที่มีการดึง 2 จุดคือตรงคาง (Mandible) และท้ายทอย (Occiput)

หน้าที่รับผิดชอบ

พยาบาลเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ ใส่ Head halter traction และให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ Head halter traction

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนราบหรือทำองศากับเตียง 30-45 องศา
2. อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบถึงประโยชน์ของการดึง Head halter traction
3. ใช้สำลีรองตรงคางและข้างศีรษะเพื่อป้องกัน Pressure sore
4. นำ Head halter ซึ่งทำจากผ้าคล้องที่ Mandible และ Occiput และนำไปคล้องกับ Spreader bar
5. โยงเชือกจาก Spreader bar ผ่านรอกไปถ่วงกับตุ้มน้ำหนักที่อยู่หัวเตียงหรือเหนือศีรษะ โดยใช้น้ำหนัก 5-10 ปอนด์หรือตามแพทย์สั่ง
6. หมั่นตรวจสอบดูบริเวณที่ดึง Head halter บ่อยๆ เพื่อป้องกัน Pressure sore
7. ดูแลการดึงถ่วงน้ำหนักโดยให้เชือกผ่านรอกเสมอและน้ำหนักต้องลอยอิสระ

ตัวชี้วัด

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง 0 %