


แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดเอชไอวีและการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา



*CITC : client-initiated testing and counseling ผู้รับบริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการต้องการตรวจหาการติดเชื้อด้วยตัวเอง

PITC: provider-initiated testing and counseling ผู้ให้บริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ

VCT : Voluntary counseling for testing

**กรณีผล IndeterminateติดตามเจาะHIV Viral load นัดฟังผลเลือด พบแพทย์ 2 สัปดาห์ if < 40 copies/ml FUเจาะANTI HIV ซ้ำอีก 3เดือน

*** กรณีที่ผู้ติดเชื้อHIV ที่มีCD4>500 cell/mm³ได้รับการให้คำปรึกษาเรื่องยาต้านไวรัสแล้ว มีความเข้าใจ แต่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มART counseling ซ้ำ (ค้นหาปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่พร้อมเริ่มยาและวางแผนร่วมกับผู้ป่วย) นัดติดตาม CD4 ทุก 3 – 6 เดือน

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อHIV และทารก ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อHIV ให้ปฏิบัติตามคู่มือ “การดูแลเด็กที่ติดเชื้อฯ”