





Rabies guideline management 2018

Pre-exposure rabies vaccine



High risk groups or Immunocompromised host



Dose :
IM 0.5-1.0 ml
ID 0.1 ml/ จุด

After mammal bite



Wound Care (Emergencies)

1. Clean Water
2. Hydrogen Peroxide
3. Alcohol
4. Antibacterial Soap
5. Hydrogen Peroxide
6. Antibacterial Soap

Prevention (3-5 days)

Amoxicillin or doxycycline

Treatment

Augmentin or 2nd or 3rd cephalosporin

Tetanus Wound Management

Vaccination History	Clean, minor wounds		All other wounds	
	Td	TIG	Td	TIG
Unknown or <3 doses	Yes	No	Yes	Yes
3+ doses	No*	No	No**	No

* Yes, if >10 years since last dose
** Yes, if >5 years since last dose

Wound category

CAT1: ผิวหนังปกติ (Normal skin)
CAT2: แผลถลอก สัตว์เลีย (Abrasion, animal lick)
CAT3: แผลมีเลือดออก (Bleeding wound)

- CAT 1 : no vaccine
- CAT 2 : Post-exposure vaccine

กรณีมาไม่ตรงนัด ไม่ต้องเริ่มฉีดใหม่ ให้นับต่อจากเข็มสุดท้ายแค่คงระยะห่างของเข็มให้เท่าเดิม

เคยได้รับครบแล้ว

Last dose of vaccine:

< 6 mo: IM 0 OR ID 0

> 6 mo: IM 0, 3 OR ID 0, 3

ไม่เคยได้รับ

IM: 0, 3, 7, 14, 28

ID: 0, 3, 7, 28

CAT 3 : Add Immunoglobulin (RIG) → ERIG (40IU/kg) —Wheat > 1cm→ HRIG (20 IU/kg)