

แนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19

จุดคัดกรอง: การใส่อุปกรณ์ป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์

- พยาบาล/จนท คัดกรอง: surgical mask, face shield, หมวก, กาวน้กันน้ำ
- พนักงานเปล: surgical mask, face shield, ถุงมือ
- พนักงานรพภ: surgical mask, face shield และอยู่ห่างมากกว่า 1 เมตร

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI

- ให้ผู้ป่วยสวม surgical mask ทันที
- พยาบาล/จนท คัดกรอง ล้างมือ และเปลี่ยนเป็น N95

ผู้ป่วย triage เข้าได้กับสีแดง, ชมพู และเหลืองที่ต้องใช้เปลนอน

ให้จนท.เปล นำผู้ป่วยไปที่ห้องแยกโรค negative pressure

ผู้ป่วย triage เข้าได้กับสีเขียว

นอกเวลาราชการ

ให้ผู้ป่วยพักรอที่ zone ARI ของ ER

ในเวลาราชการ

ส่ง Clinic ARI

- พยาบาล/จนท คัดกรอง คนที่ 1 เข้าไปวัด vital sign และติด monitor
- พยาบาล/จนท คัดกรอง คนที่ 2 แจ้งพยาบาล Incharge ผ่าน intercom/โทรศัพท์
- พยาบาล/จนท คัดกรอง คนที่ 1 ประเมินแล้วมีอาการ respiratory failure/distress และ arrest* (RR > 30, SpO₂ < 90%, accessory muscle use) ให้ครอบกล่องพลาสติกที่ศีรษะผู้ป่วย

พยาบาล Incharge แจ้งแพทย์และพยาบาล

- แพทย์และพยาบาลเปลี่ยนชุดเป็น PPE**
- หากผู้ป่วยมีอาการ respiratory failure/distress, arrest ให้ปฏิบัติตาม ACLS algorithm (แพทย์เตรียม video laryngoscope และพยาบาลเตรียม Box set สำหรับ ABC เข้าไปด้วย)

พยาบาล Incharge แจ้งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

- ให้จัด zone decontaminate บริเวณตั้งแต่หน้าห้องแยกโรคจนถึง ARI และเตรียมถุงขยะติดเชื้อไว้บริเวณนั้น
- เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดใส่ surgical mask, face shield, หมวก, กาวน้กันน้ำ, ถุงมือ และรองเท้าบูท

เมื่อพยาบาล/จนท คัดกรอง ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้ไปเปลี่ยนชุดและล้างมือ อาบน้ำ ที่ zone decontaminate

*ผู้ป่วย arrest ให้ดูที่แนวทางปฏิบัติ CPR ผู้ป่วย PUI

**การใส่PPE ให้ดูตามแนวทางการสวมชุด PPE