แนวทางการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด (Neonatal hypoglycemia)

ทารกแรกเกิดที่มี

น้ำตาลในเลือด < 40 mg/dl

↓

อาการ (มีข้อใดข้อหนึ่ง)

กระสับกระส่าย ร้องไห้เสียงแหลม งอแง ชัก เกร็งกระตุก ดูดนมได้ไม่ดี หยุดหายใจ เขียว ซึม

↓

มีอาการ (Symptomatic)

- เปิด IV
- เจาะ Lab : Blood sugar, CBC
- ให้ 10% DW 2 ml/kg ใน 1-2 นาที
- ตามด้วย 10% DW maintenance
  - Term : 65 ml/kg/day
  - Preterm : 80 ml/kg/day
- เจาะ DTX ซ้ำหลังจากได้ glucose 30 นาที

ไม่มีอาการ (Asymptomatic

- รีบให้ feed นมแม่ (ถ้าแม่ไม่มีข้อห้ามในการให้นม เช่น โรคติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่)
- เจาะ DTX ซ้ำหลังจาก feed 1 ชั่วโมง