



**ไม่ควรทำ**



ห้ามดูดแผลหรือ  
พอกแผล  
เพราะแผลจะติดเชื้อง่าย

ห้ามขันชะเนาะหรือ  
รัดแผลแน่น  
เพราะจะทำให้  
เลือดไปเลี้ยงไม่พอ



## FIRST AID FOR SNAKE BITE

(การช่วยเหลือนเบื้องต้นเมื่อโดนงูกัด)

**ควรทำ**



ตั้งสติและสังเกต  
ลักษณะของงู

ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่  
การรัดควรรัดเหนือและใต้บาดแผล  
ประมาณ 3 นิ้วมือ



ประคองส่วนที่โดนกัดให้ดีที่สุด  
และยกแผลให้ต่ำกว่าระดับหัวใจ




รีบนำผู้ป่วยส่ง  
สถานพยาบาลใกล้บ้าน

มีเวลาอย่างน้อย 30 นาที  
ในการปฐมพยาบาลก่อนอาการรุนแรง





**ดูแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้**  
**1. พิษต่อระบบประสาท (NEUROTOXIN)**  
 ได้แก่ งูเห่า งูของอาจ งูสามเหลี่ยม งูกับสมิงคลา  
**อาการ :** แขนไม่มีแรง กระวนกระวาย สิ้นเชิง ตามัว น้ำลายฟูมปาก หยุตหายใจ และเสียชีวิตในที่สุด



**2. พิษต่อระบบการแข็งตัวของเลือด (HEMATOTOXIN)** ได้แก่ งูแมวเซา งูกะปะ และงูเขียวหางไหม้  
**อาการ :** ปวดแผลมาก มีเลือดซึมออกจากแผล เลือดออกจากอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดกำเดา เหงือก ไอ อาเจียน ปัสสาวะและอุจจาระเป็นเลือด และเสียชีวิตในที่สุด



**3. พิษต่อกล้ามเนื้อ (MYTOTOXIN)** ได้แก่ งูทะเล  
**อาการ :** เจ็บปวด เครียดเกร็งของกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง เป็นอัมพาต หายใจไม่ออก และเสียชีวิตในที่สุด



**งูของอาจ (KING COBRA)**

**งูเห่า (COBRA)**

**งูแมวเซา (RUSSEL'S VIPER)**

**งูกะปะ (MALAYAN PIT VIPER)**

**งูกับสมิงคลา (MALAYAN KRAIT)**

**งูเขียวหางไหม้ (GREEN PIT VIPER)**

**งูสามเหลี่ยม (BANDED KRAIT)**

**งูทะเล (SEA SNAKE)**

**งูกัด (SNAKE BITE)**